

B-VET®

Bioregenerador epitelial USO VETERINARIO.

DESCRIPCIÓN:

B-VET® es un producto innovador y seguro en el campo veterinario para el manejo y tratamiento de diversas heridas profundas y complicadas en equinos, bovinos, porcinos, aves, ovinos, caprinos, reptiles, animales de compañía y de competición.

INDICACIONES:

B-VET® está indicado en el manejo de sitios quirúrgicos que incluyen heridas complicadas, con pérdida de sustancia y alto grado de contaminación/infección, heridas limpias o infectadas, heridas dehiscentes, heridas traumáticas, erosionadas y úlceras, heridas cavitadas, en el tratamiento de quemaduras de primer y segundo grado.

FORMULA:

Cada 40 g contiene:

Miel de abejas	30.66 g
Extracto de trigonella foenum-graecum . .	7.34 g
Policresuleno.....	120.48mg
Excipientes c.s.p.....	40.0g

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Tópica.

ESPECIES DESTINO:

Equinos, bovinos, porcinos, aves, ovinos, caprinos, reptiles, caninos, felinos.

FORMA DE USO:

- Lavar generosamente la herida con solución salina y conservar húmedo el lecho de la herida.
- El uso de desinfectantes tópicos únicamente puede considerarse por el profesional veterinario.
- Aplique B-VET directamente sobre la herida sobrepasando ligeramente los bordes.
- En heridas extensas se puede requerir mas de una unidad de B-VET para cubrirla totalmente.
- Cubra la herida con vendaje no adherente.
- Para facilitar la eliminación en casos de requerirse cambio de curación para facilitar la eliminación de B-VET, vierta solución salina.
- Consulte a su medico veterinario para que evalúe el área afectada y considere necesidad de aplicar otro medicamento para combatir lesiones por hongos o agentes infecciosos.

- A medida que la herida comienza a sanar, los apósitos se pueden dejar en su lugar hasta siete días.
- En caso de infecciones por bacterias como Pseudomonas aeruginosas las secreciones pueden aumentar los primeros tres días.
- Se recomienda que la curación se revise para observar la progresión de la herida y garantizar un tratamiento adecuado del exudado.
- Si la condición empeora o no mejora dentro de 10 a 14 días, comuníquese con su médico veterinario.
- Su aplicación en áreas extensas de la piel y/o por periodos prolongados requiere supervisión del profesional veterinario.
- Interrumpa el tratamiento si observa alguna reacción desfavorable y consulte al facultativo de inmediato en el caso que:
 - La lesión empeore.
 - Se presente enrojecimiento, dolor, hinchazón o color en el sitio de la lesión.
 - El dolor y enrojecimiento persisten por más de 7 días.

CONTRAINDICACIONES Y RESTRICCIONES:

Si presenta la mascota hipersensibilidad a uno de los componentes, suspender el uso, si las molestias persisten visitar al médico veterinario.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

- Se debe evitar la ingestión.
- No aplicar en pacientes sensibles a cualquiera de los componentes de la formula.

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN:

Almacenar en lugares secos, ventilado y protegidos de la luz.

CONSERVAR FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, ALIMENTOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS.

PERIODO DE RETIRO:

No aplica.

PRESENTACIONES:

Membrana de 40 gramos.

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACION:

Almacenar en un lugar fresco alejado de la luz y de la humedad. Almacenar a temperatura entre 15°C - 30°C (59°F-86°F).

CONSERVAR FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, ALIMENTOS Y ANIMALES DOMESTICOS.

Producto Centroamericano hecho en Guatemala por



Laboratorios Vet, S.A. para BIOMED VET / www.biomed.com.gt
Reg. San. Guatemala GT41-07-01-8974