

**“ALTO”, LEA ESTA INFORMACIÓN
ANTES DE USAR EL PRODUCTO.**

CICATRISAN®

CLASIFICACION FARMACOLÓGICA

Antibiótico, Antiséptico

FORMA FARMACEUTICA: Solución.

Uso

veterinario



FORMULA: Cada 100.0 mL contiene:

Cada 100 mL contiene:

Violeta de genciana.....0.75 g

Oxitetraciclina.....2.0 g

Excipientes c.s.p.....100 mL

DESCRIPCIÓN:

CICATRISAN® combina violeta de genciana con oxitetraciclina , lo que permite la rápida regeneración del tejido y evita contaminación microbiológica, lo que conduce a una rápida mejoría en todo tipo de heridas.

FARMACODINAMIA:

LA OXITETRACICLINA, como una tetraciclina generalmente actúa como

antibiótico bacteriostático e inhibe la síntesis de proteínas al ligarse de manera reversible a las subunidades ribosomales 30S de organismos susceptibles, previniendo la unión en esas subunidades de aminoacil RNA-transferasa. Las tetraciclinas también se cree que pueden ligarse reversiblemente a los ribosomas 50S y adicionalmente alterar la permeabilidad de la membrana citoplasmática en organismos susceptibles. A concentraciones altas las tetraciclinas también pueden inhibir la síntesis de proteínas en células de mamíferos.

LA VIOLETA GENCIANA actúa como bacteriostático. Algunos agentes tienen finalidad particular por medio de genes o los lesionan específicamente. Los colorantes básicos el violeta de cristal, reaccionan intensamente con los ácidos nucleicos de las nucleoproteínas, quizás por formación de sales.

Las bacterias gram – positivas son más sensibles que las gram – negativas diferencia asociada quizás al carácter ácido de las proteínas de las células, gram – positivas.

FARMACOCINÉTICA:

No aplica.

INDICACIONES:

CICATRISAN® está indicado en castraciones, descornadas, llagas, curaciones de ombligo, aftas, heridas, úlceras y canibalismo en aves.

ESPECIES DESTINO:

Ganado vacuno

Ganado caprino
Ganado ovino
Ganado porcino
Caninos
Aves

VÍA DE ADMINISTRACIÓN O APLICACION:

Tópica.

FORMA DE USO:

1. Agítese antes de usar.
2. Pulverizar cubriendo toda el área afectada.
3. Repita el tratamiento hasta completa sanación.

REACCIONES ADVERSAS:

La intoxicación se manifiesta con temblores y convulsiones.

CONTRAINDICACIONES Y RESTRICCIONES:

No usar en gatos.
No usar en perros lactantes

PERIODO DE RETIRO:

No aplica.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

- Se debe evitar la ingestión.
- No aplicar directamente sobre los ojos y la nariz de los animales.
- No existe antídoto específico, el tratamiento consiste en evitar el contacto adicional y en el tratamiento sintomático y de apoyo.
- Si presenta la mascota hipersensibilidad a uno de los componentes, suspender el uso, si las

molestias persisten consultar al médico veterinario.

ANTIDOTOS:

En caso de hipersalivación administrar atropina a dosis de 0.04 mg/kg.
Tras exposición dérmica lavar con abundante agua.
Por ingestión accidental, administrar sulfato de magnesio en solución al 10%.
En caso de convulsiones administrar metocarbamol por vía IV en dosis de 55-220 mg/kg.

DOSIS POR ESPECIE ANIMAL:

Según necesidad.

METODO DE PREPARACION DEL MATERIAL: N.A

METODO DE DESCONTAMINACION Y DISPOSICION FINAL DE LOS ENVASES USADOS, DERRAMES PERMANENTES, Y ECTOPARASITICIDAS NO USADOS:

En caso de derrames absorber con arena y colocar el desecho en un lugar seguro.

Rompa los envases para evitar su reutilización.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES PARA EL USO RELATIVOS A LA TOXICIDAD DE LOS INGREDIENTES EN HUMANOS:

Mantener el producto alejado de los niños, animales domésticos y alimentos.

Mantener el producto en su envase original, bien cerrado, en un lugar seguro, seco y ventilado. Proteger de la luz y temperatura extrema.

EN CASO DE INTOXICACIÓN CONSULTE AL MÉDICO Y ENTRÉGUELE ESTA ETIQUETA.

**NO ALMACENAR EN CASAS DE
HABITACIÓN MANTENGASE ALEJADO DE
LOS NIÑOS, ANIMALES Y ALIMENTOS.**

**DESTRUYASE ESTE ENVASE DESPUÉS DEL
USO DEL PRODUCTO.**

**INDICACIONES SOBRE MEDIDAS DE
PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE:**

No utilice los envases vacíos. Peligroso
para los peces y vida acuática.

Evite contaminar suelos, mantos,
corrientes y depósitos de agua utilizando
equipo adecuado.

**INDICACIONES DEL EQUIPO DE
PROTECCIÓN RECOMENDADO PARA LA
APLICACIÓN DEL PRODUCTO:**

N.A

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN:

Almacenar en un lugar fresco alejado de
la luz y de la humedad.

PRESENTACIÓN:

Envase de 60 mL, 120 mL.

REGISTROS SANITARIOS:

Guatemala GT41-17-09-3922

**EN CASO DE INTOXICACIÓN CONSULTE
AL MÉDICO Y ENTRÉGUELE ESTA**

ETIQUETA. O al Centro Nacional de
Intoxicaciones en Guatemala: Tel (502)
2251-3560, El Salvador: Hospital Rosales
Tel (503) 2525-5800 Ext. 148. Nicaragua:
(505) 2289-7150 Honduras: (504) 232-
8213, Panamá: (507) 269-2741. Costa
Rica (506) 2223-1028



Producto Centroamericano hecho en
Guatemala por Laboratorios Vet S.A
PBX:(502) 22458700

info@laboratoriosvet.com,
www.laboratoriosvet.com