

FLOXIVET® GOTAS

CLASIFICACIÓN FARMACOLÓGICA

Antibiótico

FORMA FARMACÉUTICA: Solución

Uso veterinario



FÓRMULA: Cada 10 mL contiene:

Enrofloxacin 1.0 g

Excipientes c.s.p 10 mL

DESCRIPCIÓN:

Floxivet® Gotas es un antibiótico de amplio espectro perteneciente al grupo de las fluoroquinolonas efectivo sobre bacterias gramnegativas, grampositivas y micoplasmas, sin embargo, no tiene efecto contra anaerobios. Es de fácil absorción por vía oral.

FARMACODINAMIA:

Floxivet® Gotas contiene Enrofloxacin, es un antibiótico de amplio espectro cuyo efecto es bactericida a concentraciones relativamente bajas. Actúa inhibiendo la ADN girasa (topoisomerasa II) evitando la duplicación bacteriana, la respiración y la

división celular se detienen, se interrumpen procesos celulares y se altera la integridad de la membrana. Tiene actividad principal sobre algunas bacterias grampositivas *Chlamydia psittaci*, *Mycoplasma sp.*, *Pasteurella multocida* y sobre bacilos y cocos gramnegativos (*Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*, *Campilobacter*, *Shigella*, *Salmonella sp.*).

FARMACOCINÉTICA:

La adición del grupo etilo en la molécula de enrofloxacin mejora su absorción, pero disminuye su actividad contra *Pseudomonas sp.* Cuando se administra por vía oral tiene biodisponibilidad alta y logra una buena penetración a los tejidos. Se absorbe rápidamente en especies monogástricas. **Floxivet® Gotas** se elimina por vía renal, principalmente por filtración glomerular y secreción tubular.

INDICACIONES:

Floxivet® Gotas está indicado para el tratamiento de infecciones locales y sistémicas como infecciones de vías respiratorias. En el caso de aves es indicado para el tratamiento de Coriza Infecciosa (*Haemophilus sp.*), Pasteurelosis o Cólera aviar (*Pasteurella sp.*), Micoplasmosis.

ESPECIE DESTINO:

Pavos, pollonas, pollos de engorde y aves exóticas.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral directo en el pico o en el agua de bebida.

FORMA DE USO:

Administrar la dosis recomendada en el agua de bebida, cambiar esta agua de bebida cada 24 horas, o administrar directamente en el pico del animal, según dosis.

REACCIONES ADVERSAS:

- Puede causar anorexia y un cuadro agudo de gastritis en animales mal nutridos.
- En pollitos de un día puede provocar la disminución del consumo de agua y pérdida de peso.

INTERACCIONES:

- No es compatible con compuestos que contienen aluminio, ya que reduce su absorción por quelación.

CONTRAINDICACIONES Y**RESTRICCIONES:**

- No utilizar en aves con producción de huevos.
- No utilizar en aves en crecimiento.

PERÍODO DE RETIRO:

7 días después del último tratamiento.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

- No administrar si presenta hipersensibilidad a alguno de los componentes de la fórmula.
- No utilizar en gallinas de postura.
- No utilizar en animales en crecimiento.
- Cuando se medican parvadas dejar un tiempo de descanso de 10-14 días

para uso de cama en caso de reutilización.

TRATAMIENTO DE LOS EFECTOS ADVERSOS:

- Suspender el tratamiento y consultar de inmediato al médico veterinario.

DOSIS:

Dosis terapéutica: 10-20 mg/kg de pv.

En dosis práctica utilizar 0.5 mL (10 gotas) por cada litro de agua cada 24 horas por 5 días, o bien, 2 gotas por cada 2.2 libras (1 kg) de peso.

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN:

Almacenar en un lugar fresco, seco y alejado de la luz solar.

CONSERVAR FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, ALIMENTOS Y ANIMALES DOMESTICOS.**PRESENTACIONES:**

Caja con 10 goteros de 10 mL cada uno.

REGISTROS SANITARIOS:

Guatemala GT41-07-01-344

El Salvador GT41-07-01-344

Nicaragua 10797



Producto Centroamericano hecho en Guatemala por Laboratorios Vet S.A
PBX:(502)2245-8700

info@laboratoriosvet.com
www.laboratoriosvet.com

