

## FLOXIVET® TABLETAS

### CLASIFICACION FARMACOLOGICA

Antibiótico

**FORMA FARMACEUTICA:** Tableta

**Uso veterinario**



**FORMULA:** Cada tableta de 250 mg contiene:

Enrofloxacin ..... 50 mg

Excipientes c.s.p ..... 250 mg

### DESCRIPCIÓN:

**Floxivet® Tabletas** es un antibiótico de amplio espectro perteneciente al grupo de las fluoroquinolonas, efectivo sobre bacterias grampositivas y micoplasmas, sin embargo, no tiene efecto sobre anaerobios. Es de fácil absorción por vía oral.

### FARMACODINAMIA:

**Floxivet® Tabletas** contiene **Enrofloxacin**, antibiótico de amplio espectro cuyo efecto es bactericida a concentraciones relativamente bajas. Actúa inhibiendo la ADN girasa (topoisomerasa II) evitando el enrollamiento del ADN y la agregación de nucleótidos. Tiene actividad principal sobre algunas bacterias grampositivas *Chlamydia psittaci*, *Mycoplasma sp.*, *Pasteurella multocida* y sobre bacilos y cocos gramnegativos (*Pseudomona aeruginosa*, *Escherichia coli*, *Campilobacter*, *Shigella*, *Salmonella sp.*).

### FARMACOCINÉTICA:

La adición del grupo etilo en la molécula de enrofloxacin mejora su absorción pero disminuye su actividad contra *Pseudomonas sp.* Cuando se administra por vía oral tiene biodisponibilidad alta y logra una buena penetración a los tejidos. Se elimina por vía renal, principalmente por filtración glomerular y secreción tubular.

### INDICACIONES:

**Floxivet® Tabletas** está indicado para el tratamiento de infecciones locales y sistémicas como infecciones pulmonares, cutáneas, vías urinarias, digestivas (*E. coli*), otitis y mastitis.

### ESPECIE DESTINO:

Perros y gatos

### VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral

### FORMA DE USO:

Administrar la dosis práctica recomendada de la tableta al fondo de la boca de la mascota con la ayuda de un aplicador o con la mano directamente.

### REACCIONES ADVERSAS:

- Hipersensibilidad a las Quinolonas.
- Puede causar anorexia y un cuadro agudo de gastritis en animales mal nutridos.

### CONTRAINDICACIONES Y

#### RESTRICCIONES:

- No utilizar en animales menores de 12-18 meses debido a que causa condroplasia, cambios en la

superficie articular y en algunos casos necrosis del cartílago hialino.

- En perros a una dosis de 15-25 mg/kg puede causar hiporexia, incoordinación y fasciculaciones musculares.
- No administrar en pacientes con fallo renal.

**TIEMPO DE RETIRO:**

No aplica.

**ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:**

La administración de enrofloxacin puede causar trastornos en el SNC, precaución si se administra conjuntamente fenobarbital, y precaución en administración de pacientes con fallo renal.

**TRATAMIENTO DE LOS EFECTOS ADVERSOS:**

Interrumpir el tratamiento y consultar al médico veterinario.

**DOSIS POR ESPECIE ANIMAL:**

- Dosis terapéutica en perros y gatos: 5 mg/kg lo que equivale en dosis práctica a 1 tableta por cada 10 kilos de peso cada 24 horas durante 7 días.

**ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN:**

Almacenar en un lugar fresco, seco y alejado de la luz solar.

**CONSERVAR FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, ALIMENTOS Y ANIMALES DOMESTICOS.**

**PRESENTACIONES:**

Dispensador con 28 blíster de 8 tabletas cada uno.

**REGISTROS SANITARIOS:**

Guatemala GT41-07-01-4755



Producto Centroamericano hecho y distribuido en Guatemala por Laboratorios Vet S.A PBX:(502)22458700

[info@laboratoriosvet.com](mailto:info@laboratoriosvet.com),

[www.laboratoriosvet.com](http://www.laboratoriosvet.com)