

HELMIVET® COMPUESTO TABLETA

CLASIFICACIÓN FARMACOLÓGICA

Antiparasitario interno

FORMA FARMACÉUTICA: Tableta.

Uso Veterinario.

Guatemala GT41-42-10-331

El Salvador VE2014014889

Nicaragua 10795

Honduras PF-3635

Panamá RF-7471-15



FÓRMULA:

Cada tableta de 650 mg contiene:

Praziquantel.....50 mg

Pamoato de pirantel.....250 mg

Equivalente a 86 mg de pirantel.

Excipientes c.s.p.....650 mg

DESCRIPCIÓN:

Helmivet® compuesto tabletas, contiene dos medicamentos desparasitantes y antiparasitarios internos que actúan sobre los principales nemátodos causantes de infecciones parasitarias en especies menores. Es un medicamento de fácil absorción y efecto, incluso se considera segura su administración en hembras gestantes y cachorros en la primera semana de edad.

FARMACODINAMIA:

Helmivet® compuesto tabletas contiene en su fórmula **pamoato de pirantel**, posee propiedades colinérgicas de tipo nicotínico y entonces paraliza al parásito inhibiendo su enzima acetilcolinesterasa. La enzima colinesterasa se encuentra en la parte nerviosa del parásito y su función es llevar a cabo la síntesis de proteínas que le permiten vivir, alimentarse y reproducirse. Asimismo,

contiene **Praziquantel**, es un derivado de la pirazina isoquinolona. En los céstodos principalmente provoca vacuolizaciones focales irreversibles y de esta forma son atacados fácilmente por enzimas proteolíticas que se encuentren cerca dentro del área de la infección, observando así fragmentos de parásitos parcialmente digeridos.

FARMACOCINÉTICA:

Helmivet® compuesto tabletas tiene una capacidad de absorción del 75% sobre otros medicamentos combinados con pirantel, como el citrato. En perros y gatos se absorbe en el intestino cuando se administra por vía oral en 2-3 horas posteriormente. Se distribuye en musculo, cerebro y vísceras. En el caso del **praziquantel** atraviesa la barrera hematoencefálica y la pared intestinal.

Se metaboliza por vía hepática y se elimina en mayor cantidad en orina y menor cantidad en las heces en un período de 3-4 días.

INDICACIONES:

Helmivet® compuesto tabletas está indicado para el tratamiento y prevención de parasitosis en animales de compañía provocadas por nemátodos (gusanos redondos) como: *Acylostoma spp*, *Toxocara canis*, *toxocara leonina*, *Toxocara cati*, *Ancylostoma caninum*, *Ascaris sp*, *Physaloptera sp.*, así como parasitosis causadas por céstodos (gusanos planos) como *Dipylidium caninum*, *Taenia pisciformis*, *Taenia taeniaformis*.

ESPECIE DESTINO:

Caninos y Felinos

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral

FORMA DE USO:

- Administrar de forma oral.
- En el caso de tabletas administrar según peso del animal.



CONSERVAR FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, ALIMENTOS Y ANIMALES DOMESTICOS.

DOSIS RECOMENDADA:

- Administrar a dosis terapéutica de 25 mg/kg o 1 tableta por cada 10 kg (de 1 a 22 libras) de peso.
- Repetir el tratamiento dos semanas después y luego a los 3 meses, como prevención a reinfestación.
- Dependiendo el grado de infestación el tratamiento puede ser repetido en 8 días de acuerdo con criterio del médico veterinario.

REACCIONES ADVERSAS:

- Puede producir emesis en algunas ocasiones.
- En gatos puede ocasionar salivación y/o diarrea.
- No administrar por largo tiempo, puede resultar tóxico que se manifiesta por taquipnea, sudoración, ataxia, entre otros síntomas similares.

INTERACCIONES:

- Se administra con otros antiparasitarios como la ivermectina, mebendazol y otros antiparasitarios internos para ampliar su espectro de acción.

CONTRAINDICACIONES:

- No utilizar en animales en estado débil.
- No utilizar en cachorros menores a un mes de edad ni en gatitos menores a seis semanas
- No administrar si no está bajo supervisión médico veterinario.

TIEMPO DE RETIRO:

No aplica.

ALMACENAMIENTO:

Almacenar en un lugar fresco alejado de la humedad.

PRESENTACIONES:

Cajas con 28 blíster de 2 tabletas cada uno.



Producto Centroamericano hecho en Guatemala por Laboratorios Vet S.A
PBX:(502)2245-8700

info@laboratoriosvet.com,
www.laboratoriosvet.com