

## HELMIVET SIMPLE®

### CLASIFICACIÓN FARMACOLÓGICA

Antiparasitario interno.

**FORMA FARMACÉUTICA:** Tableta

**Uso Veterinario**

### USO VETERINARIO



### FÓRMULA:

Cada tableta de 250 mg contiene:

Pamoato de pirantel.....160 mg

Equivalente a 50 mg de pirantel

Excipientes c.s.p.....250 mg

### DESCRIPCIÓN:

**HELMIVET SIMPLE® TABLETA**, es un desparasitante y antiparasitario interno que actúa sobre los principales nemátodos causantes de infecciones parasitarias en especies menores. Es un medicamento de fácil absorción y efecto, además se considera segura su administración en hembras gestantes y cachorros de en la primera semana de edad.

### FARMACODINAMIA:

**HELMIVET SIMPLE® TABLETA** contiene en su fórmula pamoato de pirantel el cual posee propiedades colinérgicas de tipo nicotínico causando una parálisis al parásito inhibiendo

su enzima acetilcolinesterasa. La enzima colinesterasa se encuentra en la parte nerviosa del parásito y su función es llevar a cabo la síntesis de proteínas que le permiten vivir, alimentarse y reproducirse.

### FARMACOCINÉTICA:

**HELMIVET SIMPLE® TABLETA** tiene una capacidad de absorción del 75% sobre otros medicamentos combinados con pirantel. En perros y gatos se absorbe bien por vía oral en un tiempo aproximado de 2-3 horas. Se metaboliza por vía hepática y se elimina en mayor cantidad en orina y menor cantidad en las heces en un período de 3-4 días.

### INDICACIONES:

**HELMIVET SIMPLE® TABLETA** está indicado para el tratamiento y prevención de parasitosis en animales de compañía provocadas por nemátodos como: *Toxocara canis*, *Toxocara leonina*, *Ancylostoma caninum* *Uncinaria stenocephala*, *Ascaris sp*, *Physaloptera sp*.

### ESPECIE DESTINO:

Caninos y Felinos

### VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral

### FORMA DE USO:

- Administrar la dosis correspondiente a la especie según el peso de esta.
- Administrar el medicamento por vía oral directamente en la boca del animal.

### DOSIS RECOMENDADA:

Dosis terapéutica para perros es 5 mg/kg de pirantel lo que equivale a 1 tableta por cada 10 kg de peso, siguiendo programa de desparasitación estratégica, administrando a los 30 min de una comida ligera.

Dosis terapéutica en gatos es de 5 mg/kg lo que es igual a 1/2 tableta por cada 5 kg de peso, siguiendo el programa de desparasitación estratégica.



Cuando la infección es por *Ancylostoma sp.* el tratamiento puede empezar a la primera semana de edad, en casos de infestaciones con *Ascaris sp.*, repetir el tratamiento. Dependiendo el grado de infestación el tratamiento puede ser repetido en 8 días de acuerdo con el criterio del médico veterinario.

**REACCIONES ADVERSAS:**

- Puede producir emesis, ataxia, sudoración, aumento de la frecuencia respiratoria en algunas ocasiones.

**INTERACCIONES:**

- En combinación con otros antiparasitarios tales como prazicuantel, ivermectina, febendazol, metronidazol entre otros, aumentan su espectro de acción. No se recomienda con Levamizol, ya que tiene el mismo mecanismo de acción y los mismos efectos tóxicos.

**CONTRAINDICACIONES Y RESTRICCIONES:**

- No utilizar en animales en estado débil.
- Uso bajo prescripción médica.

**TIEMPO DE RETIRO:**

No aplica.

**ALMACENAMIENTO:**

Almacenar en un lugar fresco alejado de la humedad.

**CONSERVAR FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, ALIMENTOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS.**

**PRESENTACIONES:**

Cajas con blíster de 2 tabletas (250 mg.) cada una.

**REGISTROS SANITARIOS:**

Guatemala: GT41-42-10-336



Producto Centroamericano hecho en Guatemala por Laboratorios Vet S.A  
PBX:(502)2245-8700

info@laboratoriosvet.com,  
www.laboratoriosvet.com