

HIDRAVET®

CLASIFICACIÓN FARMACOLÓGICA

Suero de rehidratación oral

FORMA FARMACÉUTICA: Polvo soluble

Uso veterinario



FÓRMULA: Cada sobre de 34 g contiene:

Dextrosa anhidra	20 g
Cloruro de sodio	3.5 g
Citrato trisódico	2.90 g
Cloruro de potasio	1.50 g
Ácido ascórbico	0.19 g
Sulfato de magnesio	0.481 g
Fosfato de sodio	2.84 g
Saborizantes y excipientes c.s.p	34 g

DESCRIPCIÓN:

Hidravet® es un suero oral energizante con una combinación de electrolitos que ayudan a recuperar y mantener la homeostasis del cuerpo. Es un compuesto que está indicado en animales que han perdido electrolitos a causa de enfermedades de origen infeccioso, así como en animales con ejercicio extenuante.

FARMACODINAMIA:

Hidravet® contiene una serie de electrolitos que no son más que partículas cargadas que actúan como conductores electrolíticos. Es una solución hipertónica que actúa aumentando la capacidad vascular y aumentan la permeabilidad para lograr su llegada a las células y tejidos que las han perdido a través de ósmosis.

FARMACOCINÉTICA:

Su metabolismo ocurre a nivel de todo el organismo permitiendo que se distribuya en todos los compartimientos diluyendo la presión osmótica del comportamiento extracelular.

INDICACIONES:

Hidravet® está indicado como coadyuvante en animales convalecientes de enfermedades infecciosas que causan deshidratación con síntomas como diarrea, émesis, hematorrea, secreción nasal, tos, anorexia o bien hiporexia causados por los virus de distemper, parvovirus, parainfluenza, traqueobronquitis, hepatitis canina, panleucopenia felina, así como afecciones parasitarias causadas por *Giardia sp*, *Eimeria sp*, *Toxocara sp*, *Ancylostoma caninum* y *Diphylidium caninum* entre otros. También puede utilizarse en perros con ejercicio extenuante como agua de bebida.

ESPECIE DESTINO:

Caninos y Felinos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral.

FORMA DE USO:

- Disolver el contenido del sobre en 1 litro de agua (de preferencia hervida) y administrar de 10-25 mL cada hora de acuerdo con el tamaño de la mascota.
- Desechar después de 24 horas de preparado.

EFFECTOS ADVERSOS:

- Aumento en la cantidad de orina en las primeras dosis de administración.
- Heces pastosas en los 2 días posteriores a su uso.

DOSIS RECOMENDADA:

- Es de acuerdo con el grado de deshidratación del animal, por un tiempo de 5 días, o bien la que el médico veterinario crea conveniente.
- Animales con alta actividad puede utilizarse 1 vez a la semana.

CONTRAINDICACIONES Y RESTRICCIONES:

- No administrar en pacientes que presentan vómito agudo o crónico.
- No administrar en animales con sospecha de fallo renal.
- No administrar en pacientes con obstrucción o perforación intestinal.

TIEMPO DE RETIRO:

No aplica.

ALMACENAMIENTO:

Almacenar en un lugar fresco y seco

**CONSERVAR FUERA DEL ALCANCE DE LOS
NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS.**

PRESENTACIONES:

Sobres con 34 g.

REGISTROS SANITARIOS

Guatemala GT41- 19 -02- 347

El Salvador VE2017100081

Nicaragua 10453

Panamá RF7808-16



Producto Centroamericano hecho en
Guatemala por Laboratorios Vet S.A
PBX:(502)2245-8700

info@laboratoriosvet.com,
www.laboratoriosvet.com