

PURGAVET®

CLASIFICACIÓN FARMACOLÓGICA:

Purgante

FORMA FARMACÉUTICA: Polvo soluble

Uso Veterinario



FÓRMULA:

Cada 100 g contiene:

Sulfato de magnesio.....88.5 g

Azufre sublimado.....10.0 g

Excipientes c.s.p.....100 g

DESCRIPCIÓN:

Purgavet®, es un medicamento de uso oral que ayuda a la evacuación de las heces incrementando la frecuencia y el volumen de estas, promoviendo la formación de heces más suaves y aceleran el tiempo de tránsito intestinal. La fórmula lo caracteriza por ser un laxante de tipo osmótico, es decir, que atrae agua hacia la luz del intestino para lograr la formación del bolo fecal y así ser evacuado.

FARMACODINAMIA:

Purgavet® contiene **sulfato de magnesio**, las sales de magnesio incrementan los movimientos peristálticos intestinales, el magnesio actúa en una variedad de sistemas enzimáticos. Si después de la primera dosis no se observa el efecto laxante, no se debe repetir la dosis, por el riesgo que continúe su absorción y por lo tanto ocurra depresión de los tejidos excitables del cuerpo.

Por contener magnesio provoca contracciones en músculo liso y de esta forma también expulsar la placenta en hembras recién paridas. El azufre actúa como purgante.

FARMACOCINÉTICA:

Los componentes de la fórmula se absorben a través de las paredes de intestino delgado, pasan al torrente sanguíneo y llegan a ser metabolizados por hígado y son excretados a nivel renal.

INDICACIONES:

Purgavet® está indicado para animales de producción para aliviar constipación (estreñimiento) ayuda a la eliminación de la placenta, evita el esfuerzo en hembras al momento del parto, así como para animales con falta de apetito y en caso de intoxicaciones.

ESPECIES DESTINO:

bovinos, porcinos, caprinos y ovinos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral.

FORMA DE USO:

- Disolver la dosis recomendada en 500 mL de agua previamente hervida y administrar por vía ORAL.
- Repetir la dosis cada 24 horas por 2 días máximo.
- **En caso de mejoría NO repetir. No exceder en la dosis recomendada.**

REACCIONES ADVERSAS:

- Hipersensibilidad a alguno de los componentes de la fórmula.
- Episodios de heces líquidas (diarrea) por 24 horas.

CONTRAINDICACIONES Y RESTRICCIONES:

- No utilizar el producto en animales de 6 meses de nacidos.



- No utilizar en caballos, puede causar cólico o ruptura de algún órgano interno.
- No utilizar en animales deshidratados.
- No administrar en hembras en últimas semanas de preñez.

TIEMPO DE RETIRO:

En el caso de los animales destinados a la producción se recomiendan 7 días.

DOSIS RECOMENDADA:

Vacas: 400 gramos (1 paquete)

Terneros: 100 gramos (1/4 de paquete)

Cerdos: 200 gramos (1/2 paquete)

Ovejas y cabras: 100 gramos (1/4 de paquete).

ALMACENAMIENTO:

Almacenar en un lugar fresco, seco y alejado de la luz solar.

**CONSERVAR FUERA DEL ALCANCE DE
LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS**

PRESENTACIONES:

Caja con paquete de 400 gramos.

REGISTROS SANITARIOS:

Registro GT41-48-04-3972



Producto Centroamericano hecho en
Guatemala por Laboratorios Vet S.A
PBX:(502)2245-8700

info@laboratoriosvet.com,
www.laboratoriosvet.com